

**EUSKATEL®**

Fungicīds

Sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, ziemas tritikāles, rudzu, vasaras kviešu, vasaras miežu, vasaras tritikāles un auzu sējumos.

**Darbīgā viela:** protiokonazols 250g/l

**Preparatīvā forma:** emulsijas koncentrāts

**Reģistrācijas klase:** 2

**Reģistrācijas Nr.:** 0836

**Iepakojums:** 12x1l, 4x5l

**Partijas Nr.** Skatīt uz iepakojuma

**Izgatavošanas datums:** Skatīt uz iepakojuma



**UZMANĪBU**

H315 Kairina ādu.

H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu.

H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.

P261 Izvairīties ieelpot izgarojumus/smīdinājumu.

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.

P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu.

P305+ P351+ P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.

P332+P313 Ja rodas ādas iekaisums: lūdziet mediķu palīdzību.

P337+P313 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.

P391 Savākt izšķīstīto šķidrumu.

P501 Atbrīvojies no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smīdināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Lietojot augu aizsardzības līdzekli, ievērot 5 m aizsargjoslu no lauka malas, kas robežojas ar teritorijām, ko izmanto plaša sabiedrības daļa vai mazāk aizsargātas iedzīvotāju grupas. Ja lieto 50% smīdinājuma nonesi mazinošas sprauslas, tad aizsargjosla līdz lauka malai, kas robežojas ar teritorijām, ko izmanto plaša sabiedrības daļa vai mazāk aizsargātas iedzīvotāju grupas, nav nepieciešama.

**Avārijas gadījumā ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, telefons -112.**

**Uzglabāšana.** Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, sausās, labi vēdināmās un aizslēdzamās telpās. Nepieļaut sasalšanu. Uzglabāšanas temperatūra no 0°C līdz +35°C.

**Derīguma termiņš.** 1 gads no izgatavošanas datuma, glabājot oriģinālā, neatvērtā iepakojumā.

**Ražotājs:**

Albaugh Asia Pacific Limited

Unit 6, 26/F, Trend Centre

29 Chung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong.

Tel: +86 (512) 577 11 988

**Reģistrācijas apliecības īpašnieks:**

Albaugh TKI d.o.o.

Grajski trg 21  
SI-2327 RAČE  
Slovēnija

**Importētājs:**

SIA Kreboks  
Mika iela 5, Ozolnieki,  
Ozolnieku pag., Jelgavas nov.,  
LV-3018  
Tel.: +37129234034  
[info@kreboks.lv](mailto:info@kreboks.lv)

Augu Audzēšanas Serviss SIA  
Lielvārdes iela 41, Rīga, LV-1006  
Latvija,  
Tel: +37167541995

SIA Baltic Agro  
Bauskas iela 58A-13, Rīga, LV-1004  
Tel : +371 6722 8851  
[www.balticagro.lv](http://www.balticagro.lv)

Reģistrēta Albaugh TKI d.o.o. preču zīme.

**EUSKATEL®**

Fungicīds

Sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, ziemas tritikāles, rudzu, vasaras kviešu, vasaras miežu, vasaras tritikāles un auzu sējumos.

**Darbīgā viela:** protiokonazols 250g/l

**Preparatīvā forma:** emulsijas koncentrāts

**Reģistrācijas klase:** 2

**Reģistrācijas Nr.:** 0836

**Iepakojums:** 1l, 5l

**Partijas Nr.** Skatīt uz iepakojuma

**Izgatavošanas datums:** Skatīt uz iepakojuma



**UZMANĪBU**

H315 Kairina ādu.

H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu.

H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.

P261 Izvairīties ieelpot izgarojumus/smidzinājumu.

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.

P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu.

P305+ P351+ P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.

P332+P313 Ja rodas ādas iekaisums: lūdziet mediķu palīdzību.

P337+P313 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.

P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu.

P501 Atbrīvojies no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Lietojot augu aizsardzības līdzekli, ievērot 5 m aizsargjoslu no lauka malas, kas robežojas ar teritorijām, ko izmanto plaša sabiedrības daļa vai mazāk aizsargātas iedzīvotāju grupas. Ja lieto 50% smidzinājuma nonesi mazinošas sprauslas, tad aizsargjosla līdz lauka malai, kas robežojas ar teritorijām, ko izmanto plaša sabiedrības daļa vai mazāk aizsargātas iedzīvotāju grupas, nav nepieciešama.

**Avārijas gadījumā ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, telefons -112.**

**Uzglabāšana.** Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, sausās, labi vēdināmās un aizslēdzamās telpās. Nepieļaut sasalšanu. Uzglabāšanas temperatūra no 0°C līdz +35°C.

**Derīguma termiņš.** 1 gads no izgatavošanas datuma, glabājot oriģinālā, neatvērtā iepakojumā.

**Ražotājs:**

Albaugh Asia Pacific Limited

Unit 6, 26/F, Trend Centre  
29 Chung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong.  
Tel: +86 (512) 577 11 988

**Reģistrācijas apliecības īpašnieks:**

Albaugh TKI d.o.o.  
Grajski trg 21  
SI-2327 RAČE  
Slovēnija

**Importētājs:**

SIA Kreboks  
Mika iela 5, Ozolnieki,  
Ozolnieku pag., Jelgavas nov.,  
LV-3018  
Tel.: +37129234034  
[info@kreboks.lv](mailto:info@kreboks.lv)

Augu Audzēšanas Serviss SIA  
Lielvārdes iela 41, Rīga, LV-1006  
Latvija,  
Tel: +37167541995

SIA Baltic Agro  
Bauskas iela 58A-13, Rīga, LV-1004  
Tel : +371 6722 8851  
[www.balticagro.lv](http://www.balticagro.lv)

- Reģistrēta Albaugh TKI d.o.o. preču zīme.

**Pirmā medicīniskā palīdzība:**

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, to nekavējoties mazgāt tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis gremošanas sistēmā, izdzert 100 ml ūdens.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.

Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.

Informācija ārstam: Lietot simptomātisku ārstēšanu. Specifisks antidots nav zināms.

**Saīdēšanās informācijas centra tālrunis: 67042473.**

**Drošības prasības un personāla drošība**

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu.

Augu aizsardzības līdzekli uzglabājot, transportējot un pielietojot, jāievēro visi vides aizsardzības, darba drošības un personiskās higiēnas noteikumi. Strādājot ar preparātu, lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus: aizsargtērpu, aizsargbrilles, respiratoru, gumijas cimdus un slēgtus apavus. Pēc darba nekavējoties novilkt darba apģērbu un nomazgāt rokas un seju ar ūdeni un ziepēm.

**Lietošanas instrukcija**

**EUSKATEL**<sup>®</sup> ir sistēmas iedarbības funkcīds slimību ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, ziemas tritikāles, rudzu, vasaras kviešu, vasaras miežu, vasaras tritikāles un auzu sējumos.

**EUSKATEL**<sup>®</sup> var izmantot visām komerciālajām ziemas kviešu, ziemas miežu, ziemas tritikāles, rudzu, vasaras kviešu, vasaras miežu, vasaras tritikāles un auzu šķirnēm.

**EUSKATEL® efektivitāte ar devu 0.8 l/ha**

	Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Ziemas mieži, vasaras mieži	Rudzi	Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle	Auzas
Graudzāļu miltrasa <i>Blumeria graminis</i>	XX		XX	XX	
Kviešu lapu pelēkplankumainība <i>Septoria tritici</i>	XX			XX	
Dzeltenā rūsa <i>Puccinia striiformis</i>	XXX			XXX	
Brūnā rūsa <i>Puccinia recondita</i>	XXX		XXX	XXX	
Miežu pundurrūsa <i>Puccinia hordei</i>		XXX			
Miežu lapu tīklplankumainība <i>Pyrenophora teres</i>		XXX			
Stiebrzāļu gredzenplankumainība <i>Rhynchosporium secalis</i>		XX	XX	XX	
Vārpu fuzarioze ( <i>Fusarium spp.</i> )	XX	XX		XX	
Auzu vainagrūsa ( <i>Puccinia coronata</i> )					XXX

XXX- labi ierobežo – efektivitāte > 80%

XX – vidēji ierobežo – efektivitāte 60-80%

**Lietošanas laiks un devas:**

Apstrādājamā kultūra	Kaitīgais organisms	Preparāta deva, l/ha	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Kviešu lapu pelēkplankumainība ( <i>Septoria tritici</i> ), graudzāļu miltrasa ( <i>Blumeria graminis</i> ), brūnā rūsa ( <i>Puccinia recondita</i> ), dzeltenā rūsa ( <i>Puccinia striiformis</i> )	0.8	Apsmidzināt sējumus parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	1
	Vārpu fuzarioze ( <i>Fusarium spp.</i> )	0.8	Apsmidzināt sējumus profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no kultūrauga ziedēšanas sākuma līdz ziedēšanas vidum (61-65)		
Ziemas mieži, vasaras mieži	Pundurrūsa ( <i>Puccinia hordei</i> ), miežu lapu tīklplankumainība ( <i>Pyrenophora teres</i> ), stiebrzāļu gredzenplankumainība ( <i>Rhynchosporium secalis</i> )	0.8	Apsmidzināt sējumus parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas vidum (AS 30-65)	35	1
	Vārpu fuzarioze ( <i>Fusarium spp.</i> )	0.8	Apsmidzināt sējumus profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no		

			kultūrauga ziedēšanas sākuma līdz ziedēšanas vidum (61-65)		
Rudzi	Brūnā rūsa ( <i>Puccinia recondita</i> ), stiebrzāļu gredzenplankumainība ( <i>Rhynchosporium secalis</i> ), graudzāļu miltrasa ( <i>Blumeria graminis</i> )	0.8	Apsmidzināt sējumus parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas vidum (AS 30-65)	35	1
Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle	Kviešu lapu pelēkplankumainība ( <i>Septoria tritici</i> ), brūnā rūsa ( <i>Puccinia recondita</i> ), dzeltenā rūsa ( <i>Puccinia striiformis</i> ), graudzāļu miltrasa ( <i>Blumeria graminis</i> ), stiebrzāļu gredzenplankumainība ( <i>Rhynchosporium secalis</i> ),	0.8	Apsmidzināt sējumus parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas vidum (AS 30-65)	35	1
	Vārpu fuzarioze ( <i>Fusarium spp.</i> )	0.8	Apsmidzināt sējumus profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no kultūrauga ziedēšanas sākuma līdz ziedēšanas vidum (61-65)		
Auzas	Auzu vainagrūsa ( <i>Puccinia coronata</i> )	0.8	Apsmidzināt sējumus parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	1

## DARBA ŠĶIDRUMA DAUDZUMS

**EUSKATEL**<sup>®</sup> smidzināt ar 2–3 bāru spiedienu, izlietojot 100–400 litrus ūdens uz hektāru.

Ja kultūra ir bieza vai slimības slodze / risks ir augsts, ieteicama lielāka šķidrums daudzums, lai nodrošinātu pienācīgu šķidrums nokļūšanu līdz zemākajām lapām un stublāja pamatnei. Slimības kontrole var būt zemāka pie samazināta ūdens daudzuma, kad ir grūti nodrošināt labu smidzināšanas pārklājumu.

## DARBA ŠĶIDRUMA SAGATAVOŠANA

Pirms izmantošanas smidzinātāji rūpīgi jāiztīra, filtri un sprauslas jāpārbauda, lai noteiktu, vai tie nav bojāti vai aizsprostoti.

Pirms izmantošanas iepakojumu kārtīgi sakratīt.

Nepieciešamo **EUSKATEL**<sup>®</sup> daudzumu pievienot līdz pusei piepildītā smidzinātāja tvertnē, kad darbojas maisīšanas sistēma, un pēc tam piepildīt ar ūdeni līdz nepieciešamajam līmenim. Smidzinot un smidzināšanas pārtraukumos visu laiku turpināt maisīšanu, līdz tvertne ir pilnībā tukša. Izsmidzināt uzreiz pēc sajaukšanas.

Pēc izmantošanas smidzināšanas aprīkojums rūpīgi jānotīra, lietojot mazgāšanas līdzekli.

## REZISTENCES RISKA IEROBEŽOŠANAS STRATĒGIJA

Fungicīds **EUSKATEL**<sup>®</sup> satur darbīgo vielu protiokonazolu, kas pieder DMI fungicīdu grupai, triazolu ķīmiskā grupa, FRAC kods 3. Pēc FRAC (Fungicide Resistance Action Committee) novērtējuma protiokonazols ir ar vidēju rezistences izveidošanās risku.

Vienu pašu **EUSKATEL**<sup>®</sup> nedrīkst atkārtoti smidzināt tam pašam kultūraugam, ja ir iesaistīts augsta riska patogēns, piemēram, graudzāļu miltrasa. Ir pierādīts, ka maisījumu pagatavošana tvertnē vai pārmaiņus veikta smidzināšana ar fungicīdiem ar atšķirīgu darbības veidu pasargā no rezistentu slimības formu

veidošanās.

Veiciet visus piesardzības pasākumus, lai samazinātu atslases spiedienu attiecībā uz nejutīgiem *Septoria* celmiem (piem., tvertnē pagatavots maisījums, kurā ir produkts, kam ir cits darbības mehānisms un kas iedarbojas uz *Septoria*).

Sazinieties ar konsultantu, lai saņemtu aktuālus norādījumus par pašreizējo rezistences statusu un stratēģiju marķējumā uzskaitīto graudaugu patogēnu rezistences novēršanai un pārvaldībai.

Rezistences pret fungicīdiem rīcības komiteja (Fungicide Resistance Action Committee) izstrādā ieteikumus, ar kuriem var iepazīties, lai saņemtu papildu informāciju (<https://www.frac.info>).

**BRĪDINĀJUMS:** slimības celmu, kas būs rezistenti pret **EUSKATEL**<sup>®</sup>, attīstību nav iespējams izslēgt vai paredzēt. Ja parādīsies šādi rezistenti celmi, **EUSKATEL**<sup>®</sup> nenodrošinās apmierinošu kontroli.

### **TUKŠAIS IEPAKOJUMS**

Pēc preparāta izmantošanas, tukšais iepakojums 3 reizes jāizskalo ar tīru ūdeni, kuru izmanto darba šķidruma gatavošanai. Tukšo iepakojumu atkārtoti izmantot kategoriski aizliegts. To uzglabā speciāli iekārtotā vietā un likvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

### **VIDES AIZSARDZĪBA**

Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. Preparāta izlīšanas gadījumā, piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.

### **UZGLABĀŠANA**

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, sausās, labi vēdināmās un aizslēdzamās telpās. Nepieļaut sasalšanu. Uzglabāšanas temperatūra no 0 ° līdz +35 ° C.

### **DERĪGUMA TERMIŅŠ**

1 gads no izgatavošanas datuma, glabājot oriģinālā, neatvērtā iepakojumā.

### **JURIDISKĀ ATBILDĪBA**

Visām mūsu piegādātajām precēm ir augsta kvalitāte, un mēs uzskatām, ka tās ir piemērotas jebkuram nolūkam, kādam mēs tās piegādājam, taču, tā kā mēs nevaram kontrolēt to sajaukšanu vai izmantošanu, jebkādi apstākļi un normatīvajos aktos noteiktas vai citas garantijas attiecībā uz mūsu preču kvalitāti un piemērotību jebkuram nolūkam tiek izslēgti un mēs neuzņemsimies nekādu atbildību par jebkādu kaitējumu vai traumu, ko izraisīs to uzglabāšana, rīkošanās ar tām, uzklāšana vai izmantošana.