

FORTUNE

Herbicīds.

Darbīgā viela: butil-fluazifops-P 150 g/l.

Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts.

Reģistrācijas Nr.: 0776

Reģistrācijas klase: 2

Iepakojums: 12x11, 4x51, 2x10 l

Partijas Nr. skatīt uz iepakojuma.

Izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma.



Uzmanību

- H317** Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
- H361D** Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu vēl nedzimušam bērnam.
- H411** Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
- EUH208** Satur butil-fluazifops-P. Var izraisīt alerģisku reakciju.
- EUH401** Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.
-
- P201** Pirms lietošanas saņemt speciālu instruktāžu.
- P280** Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
- P302+P352** SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu.
- P308+P313** Ja nokļūst saskarē vai saistīts ar to: lūdziet mediķu palīdzību.
- P333+P313** Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: lūdziet mediķu palīdzību.
- P391** Savākt izšļakstīto šķidrumu.
- P501** Atbrīvojies no satura/iepakojuma, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
- SPI** Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.
- SPe3** Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.
- SPe3** Lai aizsargātu izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus izdīgušus augus, ievērot šādus attālumus līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei: ja preparāta deva ir 1.25-1.66 l/ha, tad nepieciešamais attālums ir 10 m, ja preparāta deva ir 1.67 - 2.49 l/ha, tad nepieciešamais attālums ir 15 m un, ja preparāta deva ir 2.5 l/ha, tad nepieciešamais attālums ir 20 m.

Avārijas gadījumā ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam - telefons 112.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Sharda Cropchem Espana S.L.,
Edificio Atalayas Business Center,
Carill Condomina nr 3, Planta 12,
30006 Murcia, Spānija

Ražotājs:

Sharda Cropchem Limited,
Prime Business Park, Dashrathlal Joshi Road,
Wile Parle (West), Mumbai-400 050, Indija

Preparāta izplatītājs Latvijā:

SIA "Scandagra Latvia"
Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058
+371 63407196

Uzglabāšanas nosacījumi.

Uzglabāt slēgtā oriģinālā iepakojumā, sausā, tumšā un labi vēdināmā noliktavā. Uzglabāšanas t° no 0°C līdz +35°C.

Derīguma termiņš.

2 gadi no izgatavošanas datuma, glabājot oriģinālā, neatvērtā iepakojumā.

FORTUNE

Herbicīds.

Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds labību-sārņaugu, īsmūža un daudzgadīgo viendīgļlapju nezāļu ierobežošanai ābeļu, bumbieru, plūmju, ķiršu, krūmcidoniju, smiltsērķšķu, upeņu, jāņogu, ērkšķogu, krūmmelleņu, dzērveņu, aveņu, zemeņu un kartupeļu stādījumos, burkānu, galda biešu, mārrotku, rāceņu, kāļu, rutku, cigoriņu, seleriju (sakņu un kātu), pētersīļu (sakņu un lapu), pastinaku, sīpolu, ķiploku, šalotes sīpolu, salātu, zirņu (graudiem un svaigam patēriņam ar pākstīm), pupu (graudiem un svaigam patēriņam ar pākstīm), lupīnas (graudiem), sparģeļu, ziemas rapša, vasaras rapša, līnu, sojas, griķu, ķimeņu (sējas gadā), cukurbiešu, lopbarības biešu sējumos un stādījumos, kā arī lapu koku un skuju koku sējumos un stādījumos kokaudzētavās un jaunaudzēs, dekoratīvo koku, dekoratīvo krūmu un krāšņumaugu sējumos un stādījumos, sarkanā āboliņa, baltā āboliņa, bastarda āboliņa un sarkanās auzenes sējumos sēklai un papuvēs.

Darbīgā viela: butil-fluazifops-P 150 g/l.

Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts.

Reģistrācijas Nr.: 0776

Reģistrācijas klase: 2

Iepakojums: 11, 51, 101, 201.

Partijas Nr. skatīt uz iepakojuma.

Izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma.



Uzmanību

- | | |
|------------------|--|
| H317 | Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. |
| H361d | Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu vēl nedzimušam bērnam. |
| H411 | Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. |
| EUH208 | Satur butil-fluazifops-P. Var izraisīt alerģisku reakciju. |
| EUH401 | Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību. |
|
 | |
| P201 | Pirms lietošanas saņemt speciālu instruktāžu. |
| P280 | Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. |
| P302+P352 | SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu. |
| P308+P313 | Ja nokļūst saskarē vai saistīts ar to: lūdziet medicīnu palīdzību. |
| P333+P313 | Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: lūdziet medicīnu palīdzību. |
| P391 | Savākt izšļakstīto šķidrumu. |
| P501 | Atbrīvoties no satura/iepakojuma, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. |
|
 | |
| SPI | Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. |

SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

SPe3 Lai aizsargātu izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus izdīgušus augus, ievērot šādus attālumus līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei: ja preparāta deva ir 1.25-1.66 l/ha, tad nepieciešamais attālums ir 10 m, ja preparāta deva ir 1.67 - 2.49 l/ha, tad nepieciešamais attālums ir 15 m un, ja preparāta deva ir 2.5 l/ha, tad nepieciešamais attālums ir 20 m.

Avārijas gadījumā ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam - telefons 112.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Sharda Cropchem Espana S.L.,
Edificio Atalayas Business Center,
Carill Condomina nr 3, Planta 12,
30006 Murcia, Spānija

Ražotājs:

Sharda Cropchem Limited,
Prime Business Park, Dashrathlal Joshi Road,
Wile Parle (West), Mumbai-400 050, Indija

Preparāta izplatītājs Latvijā:

SIA "Scandagra Latvia"
Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058
+371 63407196

Uzglabāšanas nosacījumi.

Uzglabāt slēgtā oriģinālā iepakojumā, sausā, tumšā un labi vēdināmā noliktavā. Uzglabāšanas t° no 0°C līdz +35°C.

Derīguma termiņš.

2 gadi no izgatavošanas datuma, glabājot oriģinālā, neatvērtā iepakojumā.

Pirmā palīdzība.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nokļuvis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes. Ja augu aizsardzības līdzeklis nokļuvis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk gremošanas sistēmā, cietušajam jādod medicīniski aktivētā ogle. Neizraisīt vemšanu, bet cietušo nogādāt ārstniecības iestādē. Speciāls antidots nav zināms, pielietot simptomātisko terapiju. Jebkurā gadījumā vēlams ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.

Saindēšanās informācijas centra tālrunis: 67042473.

Drošības prasības un personāla drošība.

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Preparātu uzglabājot, transportējot un pielietojot, jāievēro visi uzglabāšanas, lietošanas, vides aizsardzības, darba drošības un personiskās higiēnas noteikumi. Strādājot ar preparātu, jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi: aizsargapģērbs, aizsargbrilles, respirators, galvassega, ķīmiski izturīgi cimdi un slēgti apavi. Pēc darba visi

individuālie aizsardzības līdzekļi jānotīra un jānomazgā.

Preparāta apraksts.

FORTUNE ir hormontipa herbicīds, kas augā tiek strauji uzņemts caur lapām. Augā tas pārvietojas pa floēmu un ksilēmu, un uzkrājas meristēmas šūnās. Butil-fluazifops- P nomāc augu dzīvības procesiem svarīgu enzīmu, kurš piedalās taukskābes sintēzē. Pirmie simptomi novērojami nedēļu pēc smidzināšanas. Augšanas punkti sāk brūnēt un iet bojā. Trīs līdz piecu nedēļu laikā nezāles pilnībā aiziet bojā.

Lietošana.

Labāku rezultātu sasniegšanai apstrādi veikt, kad nezāles ir labi sazēlušas un tām ir pietiekoša lapu virsma herbicīda uzņemšanai. Nodrošināt kvalitatīvu smidzināšanu, lai vienmērīgi noklātu auga virsmu ar darba šķidrumu. Nesmidzināt, kad nezāles cieš no sausuma. Neveikt augsnes apstrādi 2 nedēļas pirms un pēc smidzināšanas.

FORTUNE deva atkarīga no ierobežojamo nezāļu sugu sastāva un nezāļu attīstības stadijas. Nezālēm jābūt vismaz divām lapām un ne vēlāk, kā cerošanas beigās (AS 12-29). Daudzgadīgajām nezālēm jābūt 2-4 lapām un vismaz 10-15 cm garām. Kultūraugs nedrīkst nosegt ierobežojamās nezāles.

FORTUNE deva labību-sārņaugu - kviešu, miežu, rudzu, tritikāles; īsmūža viendīgļlapju nezāļu - peļastīšu lapsastes (*Alopecurus myosuroides*), parastās rudzusrūpju (*Apera spica-venti*), parastās vējauzas (*Avena fatua*), parastās gaiļšāres (*Echinochloa crus-galli*), zaļās sarenes (*Setaria viridis*), zilganās sarenes (*Setaria glauca*) un viegli ierobežojamo daudzgadīgo nezāļu - daudziedu aīrenes (*Lolium multiflorum*), daudzgadīgās aīrenes (*Lolium perenne*) ierobežošanai ir **0.6 - 1.7 l/ha**.

Daudzgadīgās nezāleslozņu vārpas (*Agropyron repens*) ierobežošanai deva ir **1.7 - 2.5 l/ha**.

Īpaši spēcīga lozņu vārpas piesārņojuma gadījumā ieteicams lietot devu 2.5 l/ha. Pēc apstrādes augsni nedrīkst rušināt aptuveni 2 nedēļas.

Lietošanas nosacījumi.

Apstrādājamie kultūraugi	Kaitīgais organisms	Preparāta deva, l/ha	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Ābeles, bumbieres, ķirši, plūmes	īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6-2.5	Apsmidzināt apdobs veģetācijas periodā, kad īsmūža nezālēm ir 2-3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2-4 lapas un tās ir 10-15 cm garas.	28	1
Krūm-cidonijas*, smiltsērķšķi*	īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6-2.5	Apsmidzināt apdobs pirms ziedēšanas vai pēc ražas novākšanas, kad īsmūža nezālēm ir 2-3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2-4 lapas un tās ir 10-15 cm garas.	-	1
Upenes, jāņogas, ērkšķogas, krūmmellenes*	īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6-2.5	Apsmidzināt apdobs pirms ziedēšanas vai pēc ražas novākšanas, kad īsmūža nezālēm ir 2-3 lapas un daudzgadīgajām	90	1

			nezālēm 2-4 lapas un tās ir 10-15 cm garas.		
Dzērvenes*	īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6-1.25	Apsmidzināt apdobs pirms ziedēšanas vai pēc ražas novākšanas, kad īsmūža nezālēm ir 2-3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2-4 lapas un tās ir 10-15 cm garas.	90	1
Avenes	īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6-2.5	Apsmidzināt apdobs pirms ziedēšanas vai pēc ražas novākšanas, kad īsmūža nezālēm ir 2-3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2-4 lapas un tās ir 10-15 cm garas	56	1
Zemenes	īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6-2.5	Apsmidzināt stādījumus pirms zemeņu ziedēšanas vai pēc ražas novākšanas, kad īsmūža nezālēm ir 2-3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2-4 lapas un tās ir 10-15 cm garas	42	1
Kartupeļi	Labības-sārņaugi, īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6-1.6	Apsmidzināt stādījumus, kad īsmūža nezālēm ir 2-3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2-4 lapas un tās ir 10-15 cm garas, līdz augu sakļaušanās vagās sākumam (AS 08-31)	90	1
Burkāni, galda bietes, mārrutki, rāceņi, kāļi, rutki, selerijas (sakņu), pētersīļi (sakņu), pastinaki	Labības-sārņaugi, īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6-1.6	Apsmidzināt sējumus un stādījumus, kad īsmūža nezālēm ir 2-3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2-4 lapas un tās ir 10-15 cm garas, sākot ar kultūrauga 2 lapu stadiju līdz saknes veidošanās sākumam (AS 12-41)	49	1
Cigoriņi* (sakņu)	Labības-sārņaugi, īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6-1.6	Apsmidzināt sējumus, kad īsmūža nezālēm ir 2-3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2-4 lapas un tās ir 10-15 cm garas, sākot ar kultūrauga 2 lapu stadiju līdz saknes veidošanās sākumam (AS 12-41)	56	1

Sīpoli, ķiploki, Šalotes sīpoli	Labības- sārņaugi, īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6-2.5	Apsmidzināt sējumus un stādījumus, kad īsmūža nezālēm ir 2-3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2-4 lapas un tās ir 10-15 cm garas, sākot ar kultūrauga 2 lapu stadiju līdz sīpola veidošanās sākumam (AS 12-41)	28	1
Salāti, selerijas (kātu), pētersīļi (lapu)	Labības- sārņaugi, īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6-1.25	Apsmidzināt sējumus un stādījumus, kad īsmūža nezālēm ir 2-3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2-4 lapas un tās ir 10-15 cm garas, sākot ar kultūrauga 2 lapu stadiju līdz astoņu lapu stadijai (AS 12-18)	42	1
Pupas (graudiem)	Labības- sārņaugi, īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6-1.25	Apsmidzināt sējumus, kad īsmūža nezālēm ir 2-3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2-4 lapas un tās ir 10-15 cm garas, sākot ar kultūrauga 2 lapu stadiju līdz stublāja pagarināšanās sākumam (AS 12-30)	90	1
Zirņi (svaigam patēriņam ar pākstīm), pupas (svaigam patēriņam ar pākstīm)	Labības- sārņaugi, īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6-2.0	Apsmidzināt sējumus, kad īsmūža nezālēm ir 2-3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2-4 lapas un tās ir 10-15 cm garas, sākot ar kultūrauga 2 lapu stadiju līdz stublāja pagarināšanās sākumam (AS 12-30)	28	1
Spargēļi	īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6-1.25	Apsmidzināt stādījumus pēc ražas novākšanas, kad īsmūža nezālēm ir 2-3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2-4 lapas un tās ir 10-15 cm garas		1
Ziemas rapsis, vasaras rapsis.	Labības- sārņaugi, īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6-2.5	Apsmidzināt sējumus, kad īsmūža nezālēm ir 2-3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2-4 lapas un tās ir 10-15 cm garas, sākot ar kultūrauga 2 lapu stadiju līdz stublāja pagarināšanās fāzes sākumam (AS 12-30)	90	1

Zirņi (graudiem), lupīna (graudiem), soja*	Labības- sārņaugi, īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6-2.0	Apsmidzināt sējumus, kad īsmūža nezālēm ir 2-3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2-4 lapas un tās ir 10-15 cm garas, sākot ar kultūrauga 2 stublāja pagarināšanās sākumam (AS 12-30)	90	1
Lini	Labības- sārņaugi, īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6-2.0	Apsmidzināt sējumus, kad īsmūža nezālēm ir 2-3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2-4 lapas un tās ir 10-15 cm garas, sākot ar kultūrauga otra lapu para stadiju līdz stiebra veidošanās sākumam (AS 12-31)	90	1
Cukurbietes, lopbarības bietes	Labības- sārņaugi, īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6-2.5	Apsmidzināt sējumus, kad īsmūža nezālēm ir 2-3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2-4 lapas un tās ir 10-15 cm garas, sākot ar kultūrauga 2 lapu stadiju līdz augu sakļaušanās vagās sākumam (AS 12-31)	56	1
Lapu koki, skuju koki kokaudzētāvās un jaunaudzēs	īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6-2.5	Apsmidzināt apdobs veģetācijas periodā, kad īsmūža nezālēm ir 2-3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2-4 lapas un tās ir 10-15 cm garas	-	1
Dekoratīvie koki, dekoratīvie krūmi, krāšņumaugi	īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6-2.5	Apsmidzināt veģetācijas periodā, kad īsmūža nezālēm ir 2-3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2-4 lapas un tās ir 10-15 cm garas	-	1
Sarkanais āboliņš, baltais āboliņš*, bastarda āboliņš*, sarkanā auzene* (sēklai)	īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6-1.5	Apsmidzināt veģetācijas periodā, kad īsmūža nezālēm ir 2-3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2-4 lapas un tās ir 10-15 cm garas	-	1
Griķi*	Labības- sārņaugi, īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6-1.6	Apsmidzināt sējumus, kad īsmūža nezālēm ir 2-3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2-4 lapas un tās ir 10-15 cm garas, sākot ar kultūrauga 2- 4 lapu stadiju (AS 12-14)	90	1
Ķīmenes* (sējas gadā)	Labības- sārņaugi, īsmūža un daudzgadīgās	0.6-1.6	Apsmidzināt sējumus sējas gadā, kad īsmūža nezālēm ir 2-3 lapas un daudzgadīgajām	-	1

	viendīgļlapju nezāles		nezālēm 2-4 lapas un tās ir 10-15 cm garas		
Papuves	Labības-sārņaugi, īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6-2.5	Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad īsmūža nezālēm ir 2-3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2-4 lapas un tās ir 10-15 cm garas.	-	1

* **Mazais lietojums.** Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu.

Atbildība.

Persona, kura lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem vai ražas zudumiem.

Piezīme.

Lai aizsargātu izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus izdīgušus augus, ievērot šādus attālumus līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei: ja preparāta deva ir 1.25-1.66 l/ha, tad nepieciešamais attālums ir 10 m, ja preparāta deva ir 1.67-2.49 l/ha, tad nepieciešamais attālums ir 15 m un, ja preparāta deva ir 2.5 l/ha, tad nepieciešamais attālums ir 20 m.

Darba šķidruma patēriņš: 100 - 400 l/ha.

Darba šķidruma sagatavošana.

Pārliecinieties par smidzinātāja tvertnes tīrību. Uzpildiet smidzinātāja tvertni līdz pusei ar tīru ūdeni, ieslēdziet maisītāju, sakratiet iepakojumu un pievienojiet nepieciešamo preparāta daudzumu. Nepārtraucot maisīšanu, pielejiet ūdeni līdz nepieciešamajam daudzumam. Sagatavotais darba šķidrums jāizlieto dažu stundu laikā.

Savietojamība.

FORTUNE var jaukt kopā ar citiem herbicīdiem. Taču ātrāka iedarbība un labāks efekts sasniegams, lietojot katru preparātu atsevišķi ar 7 dienu starplaiku. FORTUNE nedrīkst jaukt kopā ar vairāk kā vienu augu aizsardzības līdzekli. Pirms jaukšanas iepazīties ar katra preparāta lietošanas instrukciju. Pārliecinieties, ka lietošanas laiks izvēlēts pareizi katram no komponentiem. Šaubu gadījumā konsultēties ar preparātu izplatītājiem. Jaukšanas kārtība: katrs preparāts tvertnē jāiepilda atsevišķi un jāsajauc, pirms pievieno nākamo preparātu. Darba šķidruma gatavošanas laikā ūdens tvertnē visu laiku jāmais.

Rezistences veidošanās riska ierobežošana.

FORTUNE satur darbīgo vielu butil-fluazifops-P, kura ir ACC inhibitoru un saskaņā ar HRAC (Herbicide Resistance Action Committee) klasifikāciju pieder grupai A.

Lai samazinātu rezistences veidošanās risku:

- nelietot samazinātas herbicīda devas;
- FORTUNE nelietot tvertnes maisījumā vai programmā ar A grupas herbicīdiem (HRAC klasifikācija), kuri ir ACC inhibitori, kā vienīgo ķīmisko līdzekli viendīgļlapju nezāļu ierobežošanai augsekā, jāizvēlas herbicīdi, kas ir no citām grupām;
- kontrolēt herbicīdu efektivitāti un pie samazinātas efektivitātes, izvērtēt iespējamās iemeslus. Ja samazinātas efektivitātes iemesli nav izskaidrojami, tad griezties pie

reģistrācijas īpašnieka iespējamo iemeslu noskaidrošanai.

Smidzinātāja tīrīšana.

1. Pēc darba šķidruma izsmidzināšanas, uz lauka nekavējoties izskalot smidzinātāju no iekšpuses un noskalot no ārpusēs ar tīru ūdeni.
2. Smidzinātāja tvertni no iekšpuses izskalot ar tīru ūdeni un līdzekļiem, kas paredzēti smidzinātāju tīrīšanai, piemēram, *Ali Clear Extra*.
3. Smidzināšanas aparatūru tīrīt ar tīru ūdeni un īpaši šim nolūkam paredzētiem līdzekļiem. Caurules, uzgaļi, ventiļi un filtri jāizskalo un tvertni jāskalo, maisot ūdeni, vismaz 25 minūtes. Sejas maskas un filtri jātīra atsevišķi - ūdenī, kam pievienots līdzeklis, kas paredzēts smidzinātāju tīrīšanai. Tīrīšana jāveic drošā vietā.

Vides aizsardzības prasības.

Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpņu un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. Preparāta izlīšanas gadījumā piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.

Tukšais iepakojums.

Tukšo taru aizliegts izmantot citām vajadzībām. Pēc iztukšošanas to tūlīt izskalot ar ūdeni vismaz 3 reizes, skalojamo ūdeni ieliet smidzinātājā un izmantot darba šķidruma pagatavošanai. Šo vielu vai produktu un iepakojumu likvidēt drošā veidā.

Uzglabāšana.

Preparātu uzglabāt slēgtā, oriģinālā iepakojumā, sausā, tumšā, labi ventilējamā pesticīdu noliktavā. Uzglabāšanas t° no 0°C līdz $+35^{\circ}\text{C}$.

Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma, neatvērtā, oriģinālā iepakojumā.

Juridiskā atbildība.

Lietotājs ir atbildīgs par zaudējumiem no preparāta visos gadījumos, kas ir ārpus ražotāja kontroles. Visas rekomendācijas balstās uz ražotāja zināšanām par preparātu. Ražotājs garantē savu pesticīdu kvalitāti, piegādājot tos oriģinālā firmas iepakojumā. Ražotājs neatbild par zaudējumiem, kuru iemesls ir preparāta nepareiza uzglabāšana vai lietošana, jo šie procesi ir ārpus ražotāja kontroles.